



FOMOVÁ
HNILOBA



ČERNÁ
ŘEPKOVÁ



HLÍZENKA
OBEČNÁ



FUZARIÓZY
KLASU



MORFO-
REGULAČNÍ
EFEKT

TebuGUARD

FUNGICID SE ŠIROKÝM SPEKTRÉM VYUŽITÍ

TebuGUARD je systémově působící fungicidní přípravek s účinnou látkou tebuconazol. Vyniká preventivní, kurativní a eradikativní účinností proti širokému spektru hospodářsky významných houbových chorob v řepce, ječmeni a pšenici ozimé. Vyznačuje se

dlouhodobou účinností vůči houbovým patogenům. V řepce mimo účinku proti hlavním chorobám vykazuje růstově stimululační efekt, který po podzimním ošetření snižuje poškození porostu vyzimováním, po jarní aplikaci podporuje výnos a zvyšuje odolnost proti poléhání.

PŘEDNOSTI

- ▶ širokospektrální fungicid pro ochranu obilnin a řepky
- ▶ specialista na rzi a fuzariózy klasu
- ▶ fungicidní a růstově stimulační účinek v řepce
- ▶ dlouhodobá účinnost po aplikaci
- ▶ flexibilita využití, výborný TM partner s ostatními pesticidy

SPEKTRUM ÚČINKU

- ▶ Účinná látka tebuconazol je přijímána listy a stonky rostlin, následně je transpiračním proudem systémově rozváděna do celé rostliny. Tebuconazol inhibuje biosyntézu ergosterolu ve dvou fázích metabolismu, díky čemuž je zpomalená možnost vytvoření rezistence.
- ▶ Do obilnin je určený pro ochranu klasu proti fuzariózám, při vedlejší účinnosti proti padlí travnímu, braničnatce plevové a pšeničné, DTR, hnědá a rynchosporiové skvrnitosti, rzím. Do řepky je určený proti fomové hnilobě, černí řepkové a hlízence obecné s významnou vedlejší účinností k cylindrosporioze a plísni šedé. Morforegulační účinnost při aplikaci na podzim i na jaře.


Účinná látka: tebuconazol 250 g/l
Formulace: emulzní koncentrát (EW)
Balení: 5 l



řepka - fomová hniloba



černá řepková



řepka - hlízenka obecná



pšenice - fuzarióza klasu

ZPŮSOB A TERMÍN APLIKACE

Obilniny

TebuGUARD je do pšenice ozimé a ječmene registrován k cíleným aplikacím na fuzariózy klasu ve fázi od začátku do konce kvetení porostu. Pro maximální účinnost doporučujeme kombinovat se smáčedlem MultiAD při snížení dávky aplikační kapaliny na 100 až 150 l/ha. Smáčedlo zajistí špičkové pokrytí a ochranu všech částí klasu, kde na rozdíl od listu nemůžeme spoléhat na systémové působení přípravku. Redukce vody podpoří rychlejší

Řepka olejka

Podzimní ošetření proti fomové hnilobě se provádí ve fázi 4–9 listů, tebuchonazol vykazuje silný morforegulační efekt, který se využívá ke zpomalení prodlužovacího růstu řepky na podzim, k posílení kořenového krčku a podpoře tvorby postranních pupenů bočních větví, zároveň se zvyšuje odolnost k vyzimování rostlin. Podzimní dávku volíme v rozmezí 0,5 až 1 l/ha, vyšší dávka

prací postřikovače a umožní aplikaci za optimálních podmínek brzy ráno nebo večer, kdy se vyhneme poledním aplikacím za vysokých teplot při minimální efektivitě postřiku. Pro rozšíření účinnosti na listové skvrnitosti lze kombinovat s přípravky s úč. l. epoxyconazol, azoxystrobin, atd., kde vynikne zejména rychlost působení a velmi dobrý systémový účinek tebuconazolu.

posiluje fungicidní účinnost. Jarní aplikaci provádíme při výšce porostu 30 cm, kdy se morforegulační efekt projevuje zkrácením a zpevněním stonku s podporou tvorby postranních větví. Aplikace ve fázi začátku až konce kvetení zajišťuje ochranu proti hlízence obecné a černi řepkové.

Plodina	Účinnost na choroby	Dávka l/ha	Ochranná lhůta dnů	Termín aplikace
řepka olejka	fomová hniloba brukvovitých	1	56	BBCH 14–19 BBCH 30–59 max 1x
řepka olejka	černí řepková hlízinka obecná	1	56	BBCH 55–65 max 2x
ječmen	fuzariózy klasu	0,75–1	35	BBCH 61–69 max 1x
pšenice ozimá	fuzariózy klasu	1	35	BBCH 61–69 max 1x

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
obilniny, řepka	4	4	4	4


Omezení:

U řepky olejné neaplikujte na pozemek se svahitostí > 3° vzdálené od povrchové vody < 30 m.


U řepky olejné je vyloučen z PHO II. stupně povrchové vody.

TebuGUARD je dobře kombinovatelný s řadou přípravků na ochranu rostlin, nedoporučujeme kombinovat s hnojivem DAM 390.

OBILNINY



ŘEPKA OZIMÁ



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem.

Jižní, východní a střední Čechy
Západní a severní Čechy
Východní Čechy a jižní Morava
Střední a severní Morava

Jiří Šilha 724 336 184
 Kamil Štípek 602 359 904
 Martina Poláková 724 762 609
 Žaneta Hrnčířová 702 188 268

jsilha@soufflet.com
 kstipek@soufflet.com
 mpolakova@soufflet.com
 zhrncirova@soufflet.com