

FAKIR

SÁZKA NA JISTOTU



ranost
POLOPOZDNÍ

rostliny
VYSOKÉ (92 cm)

HTZ
STŘEDNÍ (42 g)

zrno
STŘEDNĚ VELKÉ


odolnost k poléhání
VELMI DOBRÁ

- ◇ **Plastická, univerzální a léty prověřená odrůda ve všech oblastech včetně přísuškových**
- ◇ **Špičková potravinářská kvalita s parametry A/E**
- ◇ **Kombinace excelentní mrazuvzdornosti (nejlépe hodnocená v SDO), střední odnoživosti, vyrovnaného zdravotního stavu, odolnosti k poléhání, středního výnosu slámy, výborné produktivity klasu a odolnosti k přísuškům**
- ◇ **Výborně snáší setí po obilnině i pozdní výsev po kukuřici, cukrovce, sóji a slunečnici**

AGRONOMICKÉ DOPORUČENÍ:

- ◆ Vyšší nebo dělené dávky CCC v BBCH 29–31 + N hnojivo 10–15 kg + **CereaSTART**, 3 l/ha/**StimSTART** 2–3 l/ha nebo **OligoSTART** 0,5–1 l/ha.
V BBCH 31–32 **MoGUARD** 0,15–0,2 l/ha a v BBCH 37–39 **EtheGUARD** 0,4–0,5 l/ha.
- ◆ Po obilních předplodinách je nezbytné preventivně ošetřit paty stébel **BoscaGUARD** 0,3 l/ha + **ProthioGUARD** 0,3 l/ha. Dle aktuálního stavu porostu ošetření listové plochy v BBCH 39–45 **AzoGUARD** 0,5 l/ha + **ProthioGUARD** 0,5/**MetcoGUARD** Plus 0,5 l/ha + **MultiAD** 0,1 l/ha. Ošetření klasu proveďte spolu s ošetřením proti savým škůdcům.
- ◆ Celkovou dávku 160–220 kg N/ha rozdělte do regenerační (50–70 kg), produkční (70–90 kg) a kvalitativní dávky (40–55 kg), přičemž v prvních dvou dávkách by měla být zahrnuta rovněž hnojiva se sírou.

Zdravotní stav



**VYKRESLÍ VÁŠ
ÚSPĚCH**